

Servei d'Urologia

Vacuna de BCG

En què consisteix el tractament?

Consisteix en administrar una vacuna dins de la bufeta urinària a través d'una sonda, amb la finalitat de prevenir la reaparició del tumor.

Habitualment s'administra vacuna de Bacillus calmette guerin (BCG). Algunes vegades es pot fer amb Mitomicina C

Us ha d'acompanyar algú?

No és necessari que vingueu acompanyats



Quina preparació heu de fer?

1. Us recomanem:

- Podeu esmorzar.
- Prendre pocs líquids abans de venir a l'hospital per evitar la necessitat d'orinar durant el tractament.
- No prendre cafè ni begudes de cola.
- Prendre algun analgèsic abans de venir a l'hospital per evitar les molèsties del sondatge, del tipus ibuprofè 600mg o paracetamol 500mg, excepte en el cas que sigueu al·lèrgic.



2. Si preneu algun medicament habitualment ho podreu fer igual, excepte si es tracta de diürètics. En aquest cas, haureu d'esperar que us hagin administrat el tractament.



Com us administraran el tractament?

- Haureu d'anar al lloc de l'hospital que us hagin indicat
- Us col·locaran una sonda urinària per tal d'administrar el medicament
- En acabar d'administrar el tractament us retiraran la sonda
- Haureu d'estar estirat al llit canviant de posició cada 15 minuts durant 2 hores: cara amunt, cara avall, d'un costat i de l'altre
- Durant aquest període de temps, haureu d'estar sense orinar

Què heu de fer després del tractament?

- Beure líquids en abundància: aigua, suc brou... durant tot el dia, per tal d'evitar els efectes secundaris que pot causar el tractament. Això estimularà l'orina i rentarà bé les restes de medicació que poden quedar a la bufeta després del tractament.
- Prendre el diürètic si és que ho feu habitualment.
- Algunes persones poden tenir irritació local com: coïssor al orinar, orinar poc i sovint. Poden aparèixer unes gotes de sang a l'orina que no solen tenir importància
- Si teniu molèsties podeu prendre l'analgèsic que preneu habitualment fins que desapareguin
- Molt poques vegades es donen reaccions generals a la vacuna: febreta, aixafament, dolores articulars lleus. Si és el vostre cas, podeu prendre un analgèsic

Quan heu de consultar al metge o a la Unitat de Quimioteràpia o anar a Urgències?

- Si hi ha febre de més de 38°C ja que pot haver-hi una infecció que caldrà tractar de seguida
- Si les molèsties a l'orinar són molt intenses i no desapareixen amb analgèsics, o si orineu amb molta sang.

Telèfon i horaris de contacte

93 883 30 01 Extensió 1085. De dilluns a divendres de 9 a 14 h