

Recollida d'orina test de sobrecàrrega de calç



Perquè la prova sigui efectiva, vostè ha d'estar en dejú de 12h. Recordi que durant tot el temps que duri la prova, només pot beure aigua.


En començar la prova (a les 7:00h del matí) ha de fer la primera micció del dia a l'WC. Després, ha de guardar en un pot gran tota l'orina que faci de les 7:00h a les 9:00h del matí.



A les 9:00h, del matí es prendrà 2 pastilles de Calcium Sandoz.

En un altre pot ha de guardar tota l'orina feta de les 9.00h a les 13.00h.

Per acabar, ha de portar els dos recipients amb orina al Servei de Laboratori a l'Hospital Universitari de Vic



Recogida de orina test de sobrecarga de calcio



Para que la prueba sea efectiva, usted debe estar en ayunas de 12h. Recuerde que durante todo el tiempo que dure la prueba, sólo puede beber agua.

Al comenzar la prueba (a las 7: 00h de la mañana) debe hacer la primera micción del día en el WC. Después, debe guardar en un frasco grande toda la orina que haga de las 7: 00h a las 9: 00h de la mañana.



A las 9: 00h, de la mañana se tomará 2 pastillas de Calcium Sandoz.

En otro recipiente, debe guardar toda la orina hecha de las 9.00h a las 13.00h.

Por último, debe llevar los dos recipientes con orina al Servicio de Laboratorio en el Hospital Universitario de Vic

